



#### Изучите основные понятия

Тургор – напряжение клеточной оболочки из-за давления внутриклеточной жидкости


Осмос – движение воды через мембрану из области низкой концентрации солей в область высокой

Изотонический раствор (0,9%) – концентрация солей как в клетке

Гипертонический раствор – концентрация солей выше, чем в клетке

Гипотонический раствор – концентрация солей ниже, чем в клетке

Плазмолиз – отделение цитоплазмы от стенки при потере воды





# Опишите состояние клетки в каждом растворе

Описание процессов	Изотонический раствор (0,9%)	Гипертонический раствор (>0,9%)	Гипотонический раствор (<0,9%)
Движение воды	Движение воды из клетки и в клетки и в клетку в равновесии	Вода выходит из клетки	Вода поступает в клетку
растительная и грибная клетка	сохраняет тургор	Плазмолиз, потеря тургора	Деплазмолиз, повышение тургора
животная клетка	сохраняет форму	Клетка сморщивается	Клетка набухает, лизис (гемолиз)



Применение знаний при решении заданий

Например: клетки кожицы лука в состоянии плазмолиза поместили в дистиллированную воду. Как изменится количество рибосом и объём цитоплазмы в клетках кожицы лука?

**Увеличилась** 

Не изменилась

**Уменьшилась** 

Внимательно прочитайте задание: клетки кожицы лука находятся в состоянии плазмолиза, следовательно протопласт отделен от клеточной стенки, т.к. клетка потеряла воду. Значит концентрация солей в клетке увеличилась



Применение знаний при решении заданий

В дистиллированной воде - гипотоническая среда, поэтому вода будет поступать к клетку, произойдет деплазмолиз - объем цитоплазмы увеличится

Рибосомы - немембранные органоиды клетки, количество которых не зависит от изменения объема цитоплазмы

В задании первый вопрос про рибосомы, а второй про объем цитоплазмы
Ответ: 31



## Применение знаний при выполнении заданий с развернутым ответом

- Например: установите осмотические условия среды обитания одноклеточных организмов по особенностям строения
- 2 Анализируем осмотические условия среды обитания

Пресноводные организмы (гипотоническая среда) — вода поступает в клетку, т.к. концентрация солей в клетке выше.

Значит требуется постоянно выводить излишки воды из клетки, необходима сократительная вакуоль для выведения излишка воды



#### Применение знаний при выполнении заданий с развернутым ответом

- Морские организмы (гипертоническая среда) вода выходит из клетки, т.к. концентрация солей в клетке ниже. Значит требуется сохранять воду в клетке, сократительная вакуоль отсутствует, т.к. нет необходимости удалять воду
- Эндопаразиты (изотоническая среда) движение воды в равновесии, т.к. концентрация солей в клетке и в окружающей среде одинакова, сократительная вакуоль отсутствует, т.к. нет необходимости удалять воду



### Применение знаний при выполнении заданий с развернутым ответом

Например: объяснить причины и механизмы физиологической засухи или консервирующее действие засолки или сушки

- 1) Физиологическая засуха состояние, при котором растение не может поглощать воду несмотря на ее наличие в среде по причинам:
  - засолённость почв: почвенный раствор гипертонический, вода не поступает в клетки
- низкая температура: снижение активности белковтранспортеров
- плохая аэрация: недостаток кислорода, дефицит АТФ, нет активного транспорта

- 2) Консервирующее действие засолки и сушки
  - при добавлении соли или удалении воды создаётся гипертоническая среда.
  - микроорганизмы теряют воду по осмосу, их рост и размножение прекращается.
  - при квашении образуется молочная кислота, угнетающая развитие нежелательных микроорганизмов